Site-Selective Dissociation upon Sulfur L-edge X-ray

Absorption in a Gas-Phase Protonated Peptide

Supporting Information

Lucas Schwob,^{†[a]} Simon Dörner,^{‡[a]} Kaan Atak,^[a] Kaja Schubert,^[a] Martin Timm,^[b] Christine Bülow,^[b] Vicente Zamudio-Bayer,^[b] Bernd von Issendorff,^[c] J. Tobias Lau,^{[b][c]} Simone Techert,^{[a][d]} and Sadia Bari^{*[a]}*

[a] Dr. L. Schwob, S. Dörner, Dr. K. Atak, K. Schubert, Prof. Dr. S. Techert, Dr. S. Bari

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Notkestrasse 85, 22607 Hamburg (Germany)

[b] M. Timm, Dr. C. Bülow, Dr. V. Zamudio-Bayer, Prof. Dr. J.T. Lau

Abteilung für Hochempfindliche Röntgenspektroskopie, Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie,

Albert-Einstein-Strasse.15, 12489 Berlin (Germany)

[c] Prof. Dr. B. von Issendorff, Prof. Dr. J.T.Lau

Physikalisches Institut, Universität Freiburg, Hermann-Herder-Straße 3, 79104 Freiburg (Germany)

[d] Prof. Dr. S. Techert

Institute of X-ray Physics, University of Göttingen, Friedrich-Hund-Platz 1, 37077 Göttingen (Germany)

Fig. 1: Calculated [Met-enk+H]⁺ LUMO+20 and atom numbering used in Table 1.

Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.
N 1	pz	0,1	H 36	py	0,1	C 59	py	0,6	O 66	px	1,4
N 1	px	0,1	H 37	s	0,8	C 60	s	1	O 66	py	0,2
N 1	py	0,2	H 37	pz	0,1	C 60	px	0,8	H 67	s	0,2
C 2	s	0,1	N 38	s	0,2	C 60	py	0,2	H 67	py	0,1
C 2	pz	0,1	N 38	pz	0,2	C 60	dxz	0,1	H 68	s	0,2
C 2	px	0,2	N 38	px	0,3	O 61	s	0,4	H 68	py	0,1
C 2	py	0,1	C 40	pz	0,1	O 61	px	0,4	H 69	s	0,7
O 4	px	0,1	C 40	px	0,3	O 61	py	0,1	H 69	pz	0,2
C 5	pz	0,1	O 41	px	0,1	C 62	s	1	H 70	s	1
C 11	px	0,1	C 42	s	0,1	C 62	px	1,1	H 70	pz	0,1
H 13	s	0,1	C 42	pz	0,1	C 62	py	0,5	H 70	py	0,2
H 17	s	0,2	C 42	px	0,1	C 63	s	4,3	H 71	s	0,8
H 19	s	0,1	C 45	s	0,1	C 63	pz	2,6	H 71	pz	0,3
H 20	s	0,1	C 45	px	0,2	C 63	px	1,7	H 71	py	0,4
H 22	s	0,1	C 47	s	0,1	C 63	py	1,5	H 72	s	1,2
C 25	px	0,1	C 47	px	0,1	C 63	dz2	0,1	H 72	pz	0,6
C 25	py	0,1	C 47	py	0,1	C 63	dyz	0,1	H 72	px	0,1
C 26	s	0,1	C 48	py	0,1	S 64	pz	0,5	H 73	s	2,4
C 26	py	0,1	H 49	s	1,7	S 64	px	16,1	H 73	pz	0,2
O 27	py	0,1	H 49	px	0,1	S 64	py	4,7	H 73	px	0,4
H 30	s	0,3	H 49	py	0,1	S 64	dz2	0,3	H 73	py	0,2
C 32	s	0,4	H 50	s	0,1	S 64	dxz	3,7	H 74	s	3
C 32	px	0,2	H 51	s	0,5	S 64	dyz	1,3	H 74	px	0,2
C 32	py	0,2	H 51	px	0,1	S 64	dx2y2	1,1	H 74	py	0,1
C 33	s	0,1	H 54	s	0,8	C 65	s	5,7	H 75	s	1,8
C 33	pz	0,1	H 56	s	0,3	C 65	pz	1,1	H 75	pz	0,4
C 33	px	0,1	H 57	s	0,1	C 65	px	2,7	H 75	py	0,1
C 33	py	0,1	N 58	pz	0,2	C 65	py	0,3	H 76	s	10,3
H 35	s	0,2	C 59	pz	0,1	C 65	dxz	0,1	H 76	pz	0,2
H 36	s	1,2	C 59	px	0,9	O 66	s	0,8	H 76	px	1,2

Table 1: Atom number, orbital type and contribution for the LUMO+20.

Fig. 2: Calculated [Met-enk+H]⁺ LUMO+28 and atom numbering used in Table 2.

Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.	Atom num.	Orb.	Con.
N 1	pz	0,2	O 27	px	0,2	C 48	s	0,4	C 63	px	1,6
N 1	px	0,1	O 27	py	0,1	C 48	pz	0,1	C 63	py	1
C 2	s	0,1	H 29	s	1,6	C 48	px	0,1	C 63	dxz	0,2
C 3	px	0,1	H 29	pz	0,1	C 48	py	1,1	C 63	dyz	0,2
C 3	py	0,4	H 29	px	0,1	H 49	s	0,1	S 64	s	4,1
O 4	pz	0,1	H 29	py	0,1	H 50	s	1,4	S 64	pz	7
C 5	pz	0,1	N 31	s	0,1	H 50	pz	0,1	S 64	px	0,2
C 5	px	0,2	N 31	px	0,1	H 50	px	0,1	S 64	py	2,1
C 7	s	0,1	C 32	pz	0,1	H 51	s	0,9	S 64	dyz	0,7
C 7	px	0,2	C 32	py	0,2	H 51	pz	0,2	S 64	dx2y2	0,1
C 8	s	0,1	C 33	pz	0,2	H 52	s	0,2	S 64	dxy	0,8
C 8	py	0,3	H 35	s	0,3	H 53	s	2,6	C 65	s	1,1
C 9	py	0,1	H 35	py	0,1	H 53	pz	0,2	C 65	pz	0,7
C 10	s	0,1	N 38	pz	0,1	H 53	px	0,1	C 65	px	2,3
C 10	pz	0,1	N 38	py	0,1	H 54	s	4,3	C 65	py	0,2
C 10	px	0,2	C 39	s	0,2	H 54	pz	0,1	C 65	dx2y2	0,1
C 10	py	0,2	C 39	pz	0,1	H 54	px	0,3	O 66	pz	0,1
C 11	s	0,1	C 39	px	0,2	H 54	py	0,1	O 66	px	0,7
C 11	pz	0,1	C 39	py	0,2	H 55	s	3,2	H 67	s	0,4
O 12	s	0,1	C 40	s	0,1	H 55	px	0,3	H 67	pz	0,1
H 13	s	0,6	C 40	pz	0,5	H 55	py	0,1	H 68	s	0,9
H 13	px	0,1	C 40	px	0,1	H 57	s	2,9	H 68	pz	0,1
H 13	py	0,1	O 41	s	0,1	H 57	py	0,4	H 68	px	0,1
H 14	s	0,1	O 41	px	0,1	N 58	s	0,1	H 69	s	5,9
H 15	s	0,1	C 42	s	0,2	N 58	px	0,5	H 69	pz	0,1
H 16	s	0,1	C 42	pz	0,8	C 59	s	0,7	H 69	px	0,7
H 17	s	0,3	C 42	px	0,1	C 59	px	0,1	H 69	py	0,3
H 18	s	0,1	C 42	py	0,2	C 59	py	0,3	H 70	s	0,2
H 19	s	0,7	C 43	s	0,1	C 60	s	1,4	H 71	s	1,9
H 20	s	0,4	C 43	pz	0,1	C 60	pz	0,7	H 71	pz	0,3
H 20	py	0,1	C 44	s	0,1	C 60	px	0,2	H 71	py	0,4
H 21	s	0,1	C 44	pz	0,6	C 60	py	0,4	H 72	s	0,4
H 22	s	1	C 44	px	0,6	C 60	dz2	0,1	H 72	pz	0,1
H 22	pz	0,1	C 44	py	0,1	O 61	s	0,3	H 72	px	0,1
H 23	s	0,1	C 45	s	0,5	O 61	pz	0,1	H 73	s	1,1
N 24	px	0,1	C 45	pz	0,4	O 61	px	0,3	H 73	px	0,2
C 25	s	0,1	C 45	px	1	C 62	s	0,5	H 74	s	0,2
C 25	pz	0,1	C 45	py	0,2	C 62	pz	1,2	H 74	px	0,3
C 25	px	0,5	C 46	s	0,2	C 62	px	0,8	H 75	s	0,6
C 25	py	0,4	C 46	pz	0,3	C 62	py	0,3	H 75	pz	0,1
C 26	s	0,1	C 46	px	1	C 62	dxz	0,1	H 75	px	0,1
C 26	pz	0,2	C 46	py	0,5	C 62	dxy	0,1	H 76	s	3,2
C 26	px	0,2	C 47	px	0,1	C 63	s	3,1	H 76	px	0,4
C 26	py	0,1	C 47	py	0,1	C 63	pz	3,1			

Table 2: Atom number, orbital type and contribution for the LUMO+28.

mass	Fragment name
75	Methionine side chain
77	C ₆ H ₅
91	Y/F side chain
97	y ₄ a ₃
102	x ₁ - methionine side chain
104	Methionine immonium
107	Tyrosine side chain
115	y ₄ b ₃
119	Y _{im} -OH
120	Phenylalanine immonium
121	y ₂ a ₄
134	z ₁
136	Tyrosine immonium
147	x ₂ a ₄
161	z ₃ a ₄
171	b ₃ -Y _{sc}
178	y ₃ a ₄

Table 3: Fragment mass and attribution.